



Raad voor
Strafrechtstoepassing
en Jeugdbescherming

W.C. Engel
[Redacted]

Datum	2 januari 2023
Onderwerp	Uw beroep van 24 augustus 2022
Ons kenmerk	22-29256/GA
Extra kenmerk	HO-2022-87

Geachte heer/mevrouw,

Bij deze ontvangt u op bovengenoemde zaak betrekking hebbende stuk(ken).

U kunt uw standpunt over het beroep uiterlijk tot en met 12 januari 2023 schriftelijk (nader) toelichten.

Met vriendelijke groet,

De Coördinator Rechtspraak

From RTMJL BMO PI Hoogvliet <[REDACTED]>
To "'Beroepen@rsj.nl'" <Beroepen@rsj.nl>
Subject FW: Verzoek om nadere inlichtingen 22/29256/GA
Date Thu, 29 Dec 2022 12:43:18 +0000

Geachte heer/mevrouw,

Zaak: 22/29256/GA, de heer W.C. Engel (beklagkenmerk: Ho-2022-87).

U vraagt in navolging op de vorige schriftelijke beantwoording om de schriftelijke beslissing van de ordemaatregel omdat dhr. vijf dagen in afzondering is geplaatst.

Dhr. Engel is niet in afzondering geplaatst maar in quarantaine i.v.m. het weigeren van de sars-cov 2 antigeentest. Het toenmalige beleid was dat deze weigeraars als besmet beschouwd werden. U snapt dat veel mensen in een relatief beperkte ruimte de verspreiding erger hadden kunnen maken. Dhr. is uitvoerig door een verpleegkundige bij binnenkomst gesproken en ook daar zijn de consequenties van het weigeren aan dhr. medegedeeld. Omdat dhr. geen klachten had werd de quarantaine na 5 dagen opgeheven (i.p.v. 10 dagen).

Een schriftelijke beslissing is door de directeur niet gemaakt.

Ik stuur u als bijlage nog extra beleidsstukken van het outbreak management team van de NIFP afd. GZ.

Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd

De directie

Beleid justitiabelen na contact met een positief getest persoon

1. Justitiabelen die behoren tot categorie 1 en 2 contacten worden op cel (EPC of MPC) in quarantaine geplaatst en direct getest met een antigeentest. Als de test is afgenomen binnen 5 dagen na de laatste blootstelling aan de besmettelijke persoon, blijft de justitiabele in quarantaine, ook als de uitslag negatief is. De justitiabele wordt op dag 5 (opnieuw) getest.
2. Wanneer men op een afdeling geen onderscheid kan maken tussen justitiabelen met nauwe (categorie 2) en niet-nauwe contacten (categorie 3), of er is meer dan één besmetting vastgesteld bij justitiabelen binnen een afdeling/groep/unit, dan wordt de hele afdeling/groep/unit op cel in quarantaine geplaatst en worden alle justitiabelen en betrokken medewerkers getest.
3. Een positief geteste justitiabele wordt direct geïsoleerd op cel (EPC). Een eventuele celgenoot wordt alleen op cel in quarantaine geplaatst.
4. Een positief geteste justitiabele met klachten blijft in isolatie tot minimaal 7 dagen na de start van de klachten én hij/zij tevens ten minste 24 uur klachtenvrij is.
5. Een positief geteste justitiabele zonder klachten blijft in isolatie tot en met dag 5 na de testafname.
6. Op dag 5 negatief geteste justitiabelen die tot de categorie 1 en 2 contacten behoren, hoeven niet langer op cel in quarantaine te blijven. Zij kunnen samen met de justitiabelen van hun afdeling gezamenlijk luchten en samen recreëren. Zij blijven wel afgezonderd van justitiabelen van andere afdelingen/groepen/units. Buiten de cel moeten zij continu een chirurgisch mondneusmasker type IIR dragen tot en met dag 10 na het laatste risicocontact.
7. Justitiabelen die behoren tot de niet-nauwe (categorie 3) contacten hoeven niet in quarantaine. Zij blijven wel afgezonderd van justitiabelen van andere afdelingen/groepen/units en moeten buiten de cel een chirurgisch mondneusmasker type IIR dragen tot en met 10 dagen na het risicocontact. Geadviseerd wordt deze justitiabelen op dag 5 na het laatste risicocontact te testen, ook als zij geen klachten hebben. Als onder categorie 1 en 2 contacten geen besmettingen worden gevonden, kan het testen van categorie 3 contacten op dag 5 achterwege worden gelaten.

8. Alle justitiabelen die zelf een COVID-19 infectie hebben doorgemaakt met een eerste ziektedag minder dan 8 weken geleden, hoeven niet op cel in quarantaine. Zij hoeven ook niet getest te worden, omdat een coronatest na een COVID-19 infectie nog weken positief kan blijven. Zij dragen een chirurgisch mondneusmasker tot de afzondering van de afdeling/groep/unit is opgeheven.

9. Alle justitiabelen die in isolatie of quarantaine verblijven mogen niet in contact komen met (onbeschermd) medewerkers of andere justitiabelen. Dit betekent dat zij alleen voor luchten, noodzakelijke activiteiten en zorg die niet kan worden uitgesteld de cel mogen verlaten met een chirurgisch mondneusmasker type IIR op en nadat zij de handen met zeep hebben gewassen.

10. De afzondering van de afdeling/groep/unit duurt voort totdat alle justitiabelen 5 dagen uit quarantaine zijn en het laatste risicocontact dus meer dan 10 dagen geleden is. De justitiabelen moeten worden geïnformeerd dat zij zich bij klachten direct melden bij de medische dienst. Bij klachten moeten zij direct geïsoleerd en (opnieuw) getest worden met een PCR- of antigeensneltest.

11. Als op meer dan één afdeling/groep/unit justitiabelen positief getest worden, zullen meer afdelingen in quarantaine moeten en meer justitiabelen en medewerkers direct getest moeten worden om duidelijk te krijgen of verdere verspreiding van het virus in de justitiële inrichting heeft plaatsgevonden. Neem bij meerdere besmettingen altijd contact op met de GGD voor advies.

12. Justitiabelen die in quarantaine op cel verblijven (categorie 1 en 2 contacten) en op of na dag 5 niet getest willen worden, moeten de quarantaineperiode van 10 dagen op cel uitzitten.

Beleid op een afdeling in quarantaine

De zorg voor justitiabelen in isolatie en quarantaine

1. Het is belangrijk tijdens de isolatie en quarantaine dagelijks zowel de negatief als positief geteste justitiabelen te observeren en te vragen naar klachten. Bij voorkeur gebeurt dit door een verpleegkundige of een arts van de medische dienst.

2. Justitiabelen die op dag 5 negatief getest zijn, hoeven in principe niet meer te worden gecontroleerd. Geadviseerd wordt wel de kwetsbare justitiabelen tot en met dag 10 te blijven observeren en te vragen naar klachten.

3. Justitiabelen die klachten ontwikkelen, moeten altijd (opnieuw) worden getest.

4. De behandelend arts bepaalt het medisch inhoudelijke beleid en welke controles met welke frequentie moeten worden uitgevoerd. Het (plv.) hoofd zorg en de behandelend arts zorgen dat de eventueel benodigde controles, ook in afwezigheid van de medische dienst (weekend), kunnen worden uitgevoerd, bijvoorbeeld door bepaalde taken te delegeren aan speciaal daarvoor geïnstrueerde medewerkers.

5. Op een afdeling/groep/unit in quarantaine of afzondering moet het aantal medewerkers dat in contact komt met de justitiabelen zo beperkt mogelijk worden gehouden. De medewerkers moeten op deze afdelingen/groep/units continu een chirurgisch mondneusmasker type IIR dragen en regelmatig de handen wassen.

Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen

1. Justitiabelen die tot de categorie 1 en 2 contacten behoren, dragen buiten hun cel een chirurgisch mondneusmasker type IIR tot en met dag 10 na het laatste risicocontact. Zij moeten goede instructies krijgen wanneer en hoe zij het mondneusmasker moeten gebruiken.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministerie van Justitie en Veiligheid.



Protocol

Bron- en contactonderzoek in justitiële inrichtingen

25-11-2021

DJI doet er alles aan om te voorkomen dat medewerkers en justitiabelen besmet raken met het coronavirus in een justitiële inrichting. Een justitiële inrichting is een bijzondere omgeving, waar medewerkers en justitiabelen langdurig samen in dezelfde ruimtes verblijven. Dit betekent dat het coronavirus zich snel kan verspreiden. Het is daarom belangrijk dat de landelijke maatregelen goed worden gevolgd, zoals regelmatig handen wassen, hoesthygiëne, 1,5 meter afstand houden en goed ventileren. Daarnaast moeten klachten die passen bij COVID-19 snel worden herkend en medewerkers en justitiabelen met klachten direct worden getest. Wordt er COVID-19 bij een medewerker of justitiabele vastgesteld, dan wordt er bron- en contactonderzoek (BCO) gedaan. Dit protocol is bedoeld als leidraad bij het uitvoeren van het BCO. Het BCO vindt altijd plaats in samenwerking met de GGD.

Wanneer moet je aan COVID-19 denken en testen?

Een persoon wordt verdacht van COVID-19 en moet zich laten testen bij één of meerdere van onderstaande klachten:

- a. verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn)
- b. (licht) hoesten
- c. benauwdheid
- d. verhoging of koorts
- e. plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)

Bij één of meer van onderstaande klachten is er reden om te testen bij contacten en kan er bij iedereen reden zijn om te testen:

- f. algehele malaise
- g. hoofdpijn
- h. spierpijn
- i. pijn achter de ogen
- j. vermoeidheid en verminderde eetlust

Minder voorkomende klachten bij COVID-19 zijn:

- | | |
|---|----------------------------------|
| k. koude rillingen | q. buikpijn |
| l. algehele pijnklachten | r. diarree |
| m. pijn bij de ademhaling | s. misselijkheid, overgeven |
| n. duizeligheid | t. oogontsteking |
| o. schorre stem | u. verschillende huidafwijkingen |
| p. prikkelbaarheid/verwardheid/delirium | |

Wat is het doel van bron- en contactonderzoek (BCO)?

Het doel van bron- en contactonderzoek (BCO) rond een positief getest persoon, de zogenaamde **index**, is:

1. De persoon, de zogenaamde **bron**, opsporen die de besmetting bij de index heeft veroorzaakt. Dit betekent navragen bij de index waar hij/zij denkt de besmetting te hebben opgelopen.
2. De personen, de zogenaamde **contacten**, identificeren die mogelijk besmet zijn geraakt door contact met een positief getest persoon in de periode dat de persoon (vermoedelijk) besmettelijk was en hen te wijzen op de maatregelen die moeten worden genomen om verdere verspreiding te voorkomen.

De kans om besmet te raken is het grootst bij de personen die intensief (op korte afstand) en/of langdurig contact hadden met de positief geteste persoon. Contact in een kleine, niet geventileerde ruimte, vergroot de kans op een besmetting.

Welke categorieën contacten kan men onderscheiden?

Er worden drie categorieën contacten onderscheiden op grond van de intensiteit van het contact met de besmette persoon.

zie lci.rivm.nl/COVID-19-bco:

- Categorie 1*: huisgenoten en celgenoten.
- Categorie 2*: overige nauwe contacten. Dit zijn contacten die cumulatief langer dan 15 minuten (binnen 24 uur) op minder dan 1,5 meter afstand contact hadden met de index tijdens zijn/haar besmettelijke periode. Nauwe contacten zijn ook personen met een hoogrisico blootstelling (bijvoorbeeld hoesten en spugen in het gezicht of direct fysiek contact).
- Categorie 3*: niet-nauwe contacten. Dit zijn contacten die:
 - langer dan 15 minuten contact hadden met de index op meer dan 1,5 meter afstand
 - minder dan 15 minuten contact hadden met de index op minder dan 1,5 meter afstand, waarbij geen sprake was van een hoogrisico blootstelling.

*Zorgmedewerkers die beschermd contact hebben gehad met een positief getest persoon worden niet als contact beschouwd en niet meegenomen in het bron- en contactonderzoek.

Wanneer wordt een persoon als immuun beschouwd?

Het beleid bij iemand die contact heeft gehad met een besmet persoon wordt medebepaald door de immuunstatus van deze persoon.

Een persoon wordt als immuun beschouwd wanneer hij/zij:

- meer dan 14 dagen geleden de vaccinatieserie heeft afgerond*
- meer dan 28 dagen geleden het Janssen-vaccin heeft ontvangen
- COVID-19 heeft doorgemaakt en 1 vaccinatie heeft ontvangen*
- minder dan 6 maanden geleden* COVID-19 heeft doorgemaakt

* Dit geldt in het kader van BCO ook voor personen met een ernstig verminderde weerstand.

Wat is de rol van de GGD bij het BCO?

De GGD heeft de wettelijke plicht om het BCO uit te voeren bij een melding van COVID-19 (Wet publieke gezondheid). Een arts heeft de wettelijke plicht om een patiënt met COVID-19 bij de GGD te melden. Voor het kunnen starten van het BCO is het belangrijk dat de GGD wordt geïnformeerd wanneer een medewerker of justitiabele in een justitiële inrichting positief is getest. De GGD voert in principe het contactonderzoek uit bij contacten buiten de justitiële inrichting, zoals bijvoorbeeld bij de huisgenoten van medewerkers of een advocaat van een justitiabele. Om deze taak te kunnen uitvoeren, moet de justitiële inrichting de contactgegevens van deze personen doorgeven aan de GGD. De justitiële inrichting voert het contactonderzoek uit bij personen in de inrichting. De GGD delegeert hiermee een deel van het BCO aan de justitiële inrichting, maar blijft wel eindverantwoordelijk. De GGD kan bij het BCO adviseren wie in welke categorie valt en welke informatie moet worden gedeeld met de contacten.

Wanneer krijgt een besmet persoon klachten?

Niet iedereen krijgt klachten na een besmetting. Als iemand wel klachten krijgt, dan ontstaan deze 2 tot 14 dagen na de besmetting. In 99% van de gevallen ontstaan de klachten binnen 10 dagen en gemiddeld na 5-6 dagen.

Wanneer is een positief getest persoon besmettelijk?

Bij een persoon met klachten (symptomatische infecties) begint de besmettelijke periode 2 dagen voor de start van de klachten. De besmettelijke periode eindigt minimaal 7 dagen na de start van de symptomen én als de persoon tevens 24 uur klachtenvrij is.

Bij personen zonder klachten (asymptomatische infecties) begint de besmettelijke periode op de testdatum en eindigt 5 dagen na de testafname.

Een medewerker of justitiabele is positief getest. Wat doe je?

Organisatie

1. Een positief geteste medewerker of justitiabele moet direct in isolatie, ook als hij/zij geen klachten heeft en ongeacht zijn/haar immuunstatus.
2. Leg vast bij wie een positief geteste medewerker zich direct kan melden als hij/zij positief is getest, ook buiten kantooruren.

3. Leg vast wie verantwoordelijk is voor het direct contact opnemen met de besmette medewerker of justitiabele om zijn/haar activiteiten in de justitiële inrichting in de besmettelijke periode door te nemen en de contacten te identificeren. Dit kan de leidinggevende (van dienst) of het afdelingshoofd zijn. Bij voorkeur worden de contacten al bij een verdenking op COVID-19 in beeld gebracht.
4. Leg vast wie positieve uitslagen van een COVID-19 test direct meldt bij de regionale GGD. Voor justitiabelen is dit de taak van de medische dienst. Voor medewerkers is dit afhankelijk van de persoon/organisatie onder wiens verantwoordelijkheid de test plaatsvindt.
5. Zet een vast team in voor de analyse van het gesprek met de besmette medewerker of justitiabele. Dit team bestaat bij voorkeur uit het (plv.) hoofd zorg, een arts en een preventiemedewerker aangevuld met de persoon die het gesprek heeft gevoerd met de besmette persoon.
6. Bespreek met een vast team direct na de analyse van de contacten welke acties direct noodzakelijk zijn en wie die acties uitvoert en communiceert. Dit team bestaat bij voorkeur uit het afdelingshoofd van de betrokken afdeling, het (plv.) hoofd zorg, een arts, een preventiemedewerker, een directielid en een vertegenwoordiger van het actieteam.
7. De GGD voert het BCO-gesprek met een positief geteste medewerker voor de contacten buiten de justitiële inrichting. Informatie over de isolatie, quarantaine en inzetbaarheid van medewerkers is te vinden in de [Q&A voor medewerkers](#) op intranet.
8. Bij drie of meer gerelateerde besmettingen is er sprake van een uitbraak en moet de GGD ondersteuning bieden bij het BCO en het testen in de justitiële inrichting.
9. Er wordt een tijdelijke, afgeschermd contactlijst gemaakt, die na afsluiting van het BCO wordt vernietigd.
10. Bij het afsluiten van het BCO wordt geadviseerd de resultaten van het BCO anoniem terug te koppelen aan het management, de medische dienst, het COVID-19 actieteam. Dit biedt de mogelijkheid het proces te analyseren/evalueren en verbeterpunten door te voeren.
11. Het (plv.) hoofd zorg, in samenspraak met de GGD en huisarts, informeert/adviseert het hoofd van de afdeling over de te nemen preventieve maatregelen op de leefafdeling.

Identificeren contacten en eventuele bron

1. Om het BCO rond een positief geteste medewerker te kunnen starten, zal de medewerker de justitiële inrichting vrijwillig moeten informeren over zijn/haar besmetting. Het melden van een uitslag van een medisch onderzoek aan de werkgever is niet verplicht. Echter, het niet melden kan consequenties hebben voor zowel de bedrijfsvoering als de persoon zelf (zie de [Q&A voor medewerkers](#)).
2. Het BCO-gesprek met een positief geteste medewerker of justitiabele vindt zo spoedig mogelijk plaats. Tijdens het BCO-gesprek wordt nagegaan wat de daadwerkelijke eerste ziektedag was. Dit is de dag waarop de klachten ontstonden. Vervolgens wordt gekeken aan welke activiteiten betrokkene heeft deelgenomen vanaf twee dagen voordat hij/zij klachten ontwikkelde tot het moment dat hij/zij in isolatie ging. Daarbij moet op basis van het dagprogramma feitelijk van minuut tot minuut worden uitgevraagd welke contactmomenten er zijn geweest, waar, wanneer, met wie en de intensiteit van het contact. Er wordt een contactlijst opgesteld met de geïdentificeerde contacten. Ook worden de contacten gecategoriseerd. Hierbij kan de GGD ondersteunen. Toets waar mogelijk de betrouwbaarheid van de ingewonnen informatie.
3. Voor het vinden van de mogelijke bron wordt bij de index nagevraagd waar hij/zij denkt de besmetting te hebben opgelopen. Bij een geïdentificeerde bron wordt uiteraard ook rond de bron contactonderzoek verricht.
4. Mocht de justitiabele in zijn/haar besmettelijke periode buiten de justitiële inrichting zijn geweest, dan moeten ook de contacten buiten de justitiële inrichting in beeld gebracht worden (politie, DV&O, persoonlijke contacten). Met de GGD wordt besproken wie deze personen op de contactlijst het best kan informeren. In principe informeert de GGD personen buiten de justitiële inrichting. DJI zal dan wel de contactgegevens van deze personen moeten aanleveren.

Communicatie

De medische dienst, het COVID-19 actieteam en het afdelingshoofd stemmen met elkaar af wie de regie voert over de te nemen maatregelen op de afdeling en wie zorgt voor het communiceren van de maatregelen naar het management, de justitiabelen en de medewerkers van de justitiële inrichting.

Beleid positief geteste medewerkers met klachten ongeacht immuunstatus

Een positief geteste medewerker met klachten moet thuis in isolatie tot minimaal 7 dagen na de start van de klachten én hij/zij ten minste 24 uur klachtenvrij is. Medewerkers met een ernstig verminderde weerstand moeten minimaal 14 dagen in thuisisolatie. De behandelend arts beoordeelt wanneer de isolatie kan worden opgeheven.

Beleid immune medewerkers na contact met een positief getest persoon

1. Immune medewerkers met een positief geteste huisgenoot moeten thuis in quarantaine en zich zo spoedig mogelijk (binnen 24 uur) laten testen. Is de testuitslag positief (dag 0) dan blijven zij tot en met 5 dagen na de testafname in isolatie. Vanaf dag 6 mogen zij uit isolatie. Medewerkers die niet thuis kunnen werken, mogen weer naar hun werk. Zij dragen t/m dag 10 na de testafname continu een chirurgisch mondneusmasker type IIR. Medewerkers die thuis kunnen werken, blijven thuis t/m dag 10 na de testafname. Is de testuitslag (vóór dag 5) negatief (of is er nog geen test afgenomen), dan laten zij zich 5 dagen na de testdag van de huisgenoot opnieuw testen met een PCR-, LAMP- of antigeensneltest, ook als zij geen klachten hebben. Is de testuitslag op dag 5 negatief, dan kunnen medewerkers die niet thuis kunnen werken, weer naar hun werk. Zij moeten t/m 10 na het laatste risicocontact met de huisgenoot continu een chirurgisch mondneusmasker type IIR dragen. Medewerkers die thuis kunnen werken, blijven thuis werken t/m dag 10 of langer als de leidinggevende dit vraagt. Is de testuitslag op dag 5 positief, dan moet de medewerker in isolatie. Als er geen klachten bestaan, dan duurt de isolatie tot en met dag 5 na de testafname. Op dag 6 mag de medewerker weer werken. Hij/zij draagt tot en met dag 10 na de testafname continu een chirurgisch mondneusmasker type IIR.

2. Immune medewerkers met een positief getest nauw contact (categorie 2 contact) hoeven niet in quarantaine. Medewerkers die thuis kunnen werken, blijven thuiswerken tot en met dag 10 na het laatste contact. Zij hoeven zich alleen te laten testen bij klachten en als de GGD dat adviseert. Medewerkers die niet thuis kunnen werken laten zich 5 dagen na het laatste risicocontact testen met een PCR-, LAMP- of antigeensneltest, ook als zij geen klachten hebben. Zij hoeven niet thuis te blijven in afwachting van de testuitslag. Zij dragen tot en met dag 10 continu een chirurgisch mondneusmasker type IIR. De GGD test in principe geen immune categorie 2 contacten op dag 5, tenzij het een zorgmedewerker betreft. Het is dus belangrijk als men zich laat testen bij de GGD te melden dat de test een zorgmedewerker betreft. Ook als de persoon geen zorgmedewerker is maar wel met justitiabelen in contact komt tijdens het werk, moet hij/zij melden dat het een test voor een zorgmedewerker betreft.
Is de testuitslag op dag 5 positief, dan moet de medewerker in isolatie. Als er geen klachten bestaan, dan eindigt de isolatie 72 uur na de testafname. Op dag 4 mag de medewerker weer werken. Hij/zij draagt tot en met dag 10 na de testafname continu een chirurgisch mondneusmasker type IIR.
3. Medewerkers zonder klachten die zelf een COVID-19 infectie hebben doorgemaakt met een eerste ziektedag minder dan 8 weken geleden, hoeven niet te worden getest, omdat een coronatest na een COVID-19 infectie nog weken positief kan blijven zonder dat zij besmettelijk zijn. Als zij niet thuis kunnen werken, kunnen zij vanaf dag 5 aan het werk. Zij dragen tot en met dag 10 na het laatste risicocontact continu een chirurgisch mondneusmasker type IIR.
Medewerkers die behoren tot de categorie 3 contacten hoeven niet in quarantaine. Zij hoeven in principe geen chirurgisch mondneusmasker te dragen t/m dag 10 na het risicocontact. Echter, voor de eenduidigheid in de inrichting zou hier wel voor gekozen kunnen worden. Zij hoeven zich alleen op dag 5 te laten testen als het contact een positief geteste collega of justitiabele in de inrichting betreft EN er besmettingen zijn vastgesteld onder categorie 2 contacten.

Beleid niet-immune medewerkers na contact met een positief getest persoon

1. Niet-immune medewerkers die behoren tot de categorie 1 en 2 contacten moeten strikt thuisblijven en zich, ook als zij geen klachten hebben, zo spoedig mogelijk (binnen 24 uur) laten testen met een PCR-, LAMP- of antigeensneltest. Als de test is afgenomen binnen 5 dagen na de laatste blootstelling aan de besmettelijke persoon, blijft de medewerker in quarantaine, ook als de uitslag negatief is. De medewerker laat zich op dag 5 (opnieuw) testen.
2. Medewerkers die behoren tot de categorie 1 of 2 contacten mogen bij een negatieve testuitslag op of na dag 5 uit quarantaine. Medewerkers die thuis kunnen werken, blijven thuiswerken t/m dag 10 na het laatste risicocontact. Medewerkers die niet thuis kunnen werken, kunnen weer naar hun werk. Zij dragen continu een chirurgisch mondneusmasker type IIR tot en met dag 10 na het laatste risicocontact.
3. Een positief geteste medewerker zonder klachten mag 5 dagen na de testafname uit isolatie. Medewerkers die thuis kunnen werken, blijven thuiswerken t/m dag 10 na de testafname. Medewerkers die niet thuis kunnen werken, kunnen weer naar hun werk. Zij dragen continu een chirurgisch mondneusmasker type IIR tot en met dag 10 na de testafname.
4. Medewerkers die behoren tot de categorie 3 contacten hoeven niet in quarantaine en mogen werken als zij in de justitiële inrichting continu een chirurgisch mondneusmasker type IIR dragen tot en met dag 10 na het laatste risicocontact. Als het contact een positief geteste collega in de inrichting of justitiabele betreft, wordt de medewerker geadviseerd zich op dag 5 te laten testen. Als onder categorie 1 en 2 contacten geen besmettingen worden gevonden, kan het testen van categorie 3 contacten achterwege worden gelaten.
5. Een medewerker die klachten ontwikkelt, moet zich altijd direct (opnieuw) laten testen (in principe door de GGD), ook als hij/zij eerder negatief is getest.

Beleid justitiabelen na contact met een positief getest persoon

1. Justitiabelen die behoren tot categorie 1 en 2 contacten worden op cel (EPC of MPC) in quarantaine geplaatst en direct getest met een antigeensneltest. Als de test is afgenomen binnen 5 dagen na de laatste blootstelling aan de besmettelijke persoon, blijft de justitiabele in quarantaine, ook als de uitslag negatief is. De justitiabele wordt op dag 5 (opnieuw) getest.
2. Wanneer men op een afdeling geen onderscheid kan maken tussen justitiabelen met nauwe (categorie 2) en niet-nauwe contacten (categorie 3), of er is meer dan één besmetting vastgesteld bij justitiabelen binnen een afdeling/groep/unit, dan wordt de hele afdeling/groep/unit op cel in quarantaine geplaatst en worden alle justitiabelen en betrokken medewerkers getest.
3. Een positief geteste justitiabele wordt direct geïsoleerd op cel (EPC). Een eventuele celgenoot wordt alleen op cel in quarantaine geplaatst.
4. Een positief geteste justitiabele met klachten blijft in isolatie tot minimaal 7 dagen na de start van de klachten én hij/zij tevens ten minste 24 uur klachtenvrij is.
5. Een positief geteste justitiabele zonder klachten blijft in isolatie tot en met dag 5 na de testafname.
6. Op dag 5 negatief geteste justitiabelen die tot de categorie 1 en 2 contacten behoren, hoeven niet langer op cel in quarantaine te blijven. Zij kunnen samen met de justitiabelen van hun afdeling gezamenlijk luchten en samen recreëren. Zij blijven wel afgezonderd van justitiabelen van andere afdelingen/groepen/units. Buiten de cel moeten zij continu een chirurgisch mondneusmasker type IIR dragen tot en met dag 10 na het laatste risicocontact.
7. Justitiabelen die behoren tot de niet-nauwe (categorie 3) contacten hoeven niet in quarantaine. Zij blijven wel afgezonderd van justitiabelen van andere afdelingen/groepen/units en moeten buiten de cel een chirurgisch mondneusmasker type IIR dragen tot en met 10 dagen na het risicocontact. Geadviseerd wordt deze justitiabelen op dag 5 na het laatste risicocontact te testen, ook als zij geen klachten hebben. Als onder categorie 1 en 2 contacten geen besmettingen worden gevonden, kan het testen van categorie 3 contacten op dag 5 achterwege worden gelaten.

8. Alle justitiabelen die zelf een COVID-19 infectie hebben doorgemaakt met een eerste ziektedag minder dan 8 weken geleden, hoeven niet op cel in quarantaine. Zij hoeven ook niet getest te worden, omdat een coronatest na een COVID-19 infectie nog weken positief kan blijven. Zij dragen een chirurgisch mondneusmasker tot de afzondering van de afdeling/groep/unit is opgeheven.
9. Alle justitiabelen die in isolatie of quarantaine verblijven mogen niet in contact komen met (onbeschermd) medewerkers of andere justitiabelen. Dit betekent dat zij alleen voor luchten, noodzakelijke activiteiten en zorg die niet kan worden uitgesteld de cel mogen verlaten met een chirurgisch mondneusmasker type IIR op en nadat zij de handen met zeep hebben gewassen.
10. De afzondering van de afdeling/groep/unit duurt voort totdat alle justitiabelen 5 dagen uit quarantaine zijn en het laatste risicocontact dus meer dan 10 dagen geleden is. De justitiabelen moeten worden geïnformeerd dat zij zich bij klachten direct melden bij de medische dienst. Bij klachten moeten zij direct geïsoleerd en (opnieuw) getest worden met een PCR- of antigeensneltest.
11. Als op meer dan één afdeling/groep/unit justitiabelen positief getest worden, zullen meer afdelingen in quarantaine moeten en meer justitiabelen en medewerkers direct getest moeten worden om duidelijk te krijgen of verdere verspreiding van het virus in de justitiële inrichting heeft plaatsgevonden. Neem bij meerdere besmettingen altijd contact op met de GGD voor advies.
12. Justitiabelen die in quarantaine op cel verblijven (categorie 1 en 2 contacten) en op of na dag 5 niet getest willen worden, moeten de quarantaineperiode van 10 dagen op cel uitzitten.

Beleid op een afdeling in quarantaine

De zorg voor justitiabelen in isolatie en quarantaine

1. Het is belangrijk tijdens de isolatie en quarantaine dagelijks zowel de negatief als positief geteste justitiabelen te observeren en te vragen naar klachten. Bij voorkeur gebeurt dit door een verpleegkundige of een arts van de medische dienst.
2. Justitiabelen die op dag 5 negatief getest zijn, hoeven in principe niet meer te worden gecontroleerd. Geadviseerd wordt wel de kwetsbare justitiabelen tot en met dag 10 te blijven observeren en te vragen naar klachten.
3. Justitiabelen die klachten ontwikkelen, moeten altijd (opnieuw) worden getest.
4. De behandelend arts bepaalt het medisch inhoudelijke beleid en welke controles met welke frequentie moeten worden uitgevoerd. Het (plv.) hoofd zorg en de behandelend arts zorgen dat de eventueel benodigde controles, ook in afwezigheid van de medische dienst (weekend), kunnen worden uitgevoerd, bijvoorbeeld door bepaalde taken te delegeren aan speciaal daarvoor geïnstrueerde medewerkers.
5. Op een afdeling/groep/unit in quarantaine of afzondering moet het aantal medewerkers dat in contact komt met de justitiabelen zo beperkt mogelijk worden gehouden. De medewerkers moeten op deze afdelingen/groep/units continu een chirurgisch mondneusmasker type IIR dragen en regelmatig de handen wassen.

Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen

1. Justitiabelen die tot de categorie 1 en 2 contacten behoren, dragen buiten hun cel een chirurgisch mondneusmasker type IIR tot en met dag 10 na het laatste risicocontact. Zij moeten goede instructies krijgen wanneer en hoe zij het mondneusmasker moeten gebruiken.
2. Medewerkers die tot de categorie 1, 2 en 3 contacten behoren en niet (meer) in thuisquarantaine verblijven, dragen tot en met dag 10 na het laatste risicocontact continu een chirurgisch mondneusmasker type IIR in de justitiële inrichting. Dit vereist goede instructies aan de betrokken medewerkers en de juiste logistiek wat betreft de mondneusmaskers. De niet-medische mondneusmaskers zijn namelijk niet te onderscheiden van de chirurgische mondneusmaskers type IIR zodra ze uit de oorspronkelijk doos zijn.
3. Op een afdeling/groep/unit die in quarantaine of afzondering is, dragen alle medewerkers continu een chirurgisch mondneusmasker type IIR en wassen regelmatig de handen. Naast de gebruikelijke hygiënemaatregelen zijn aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen niet nodig.
4. Voor het betreden van de cel van een positief geteste justitiabele moeten een chirurgisch mondneusmasker type IIR, een spatbril/faceshield, schort met lange mouwen en wegwerphandschoenen worden gedragen. Het is van belang dat medewerkers goed op de hoogte zijn van de te nemen maatregelen en bekend zijn met het juiste gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. De directie en leidinggevenden moeten erop toezien dat medewerkers zich adequaat beschermen.

Meer informatie

Zie voor de maatregelen tijdens de isolatie het [protocol 'Isolatie in een justitiële inrichting'](#) op ons intranet. Zie voor het actuele gebruik van testen de volgende links: <https://lci.rivm.nl/sites/default/files/2021-01/COVID-19%20Welke%20testen%20bij%20welke%20groepen.pdf> en <https://lci.rivm.nl/covid-19-welke-testen-bij-welke-groepen>.

Colofon

Dit protocol is een publicatie van:
Outbreak Management Team van
Dienst Justitiële Inrichtingen
Postbus 30132 2500 GC Den Haag

Dit protocol is bedoeld voor intern gebruik bij DJI. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. DJI aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in dit protocol.

© Dienst Justitiële Inrichtingen, 25 november 2021